

**LEADER Mg S**

Koncentruota Magnio ir Sieros elementų traša, skirta augalų tręšimui per lapus

SUDĖTIS

Magnis (MgO):	340 g/l	34,0% w/w	(23,6% w/w)
Siera (SO ₃):	638 g/l	63,6% w/w	(44,2% w/w)
Koncentruota suspensija (SC).			
Fizikinis svoris: 1,43 – 1,45 kg/L			

NORMOS IR NAUDOJIMO LAIKOTARPIS

1,5 – 7,0 l/ha, su mažiausiai 200l/ha vandens.

Vandens kiekis didinamas atsižvelgiant į pasėlio tankumą ir lapijos kiekį.

Javai: 1,5-4 l/ha. Purkšti nuo 3 lapelių tarpinio ir kartoti pagal poreikį.**Rapsai: 1,5-4 l/ha.** Purkšti rudenį, kai rapsai turi 6-8 lapelius. Pavasarį, jei reikia, pakartoti.**Pupos, žirniai: 4-7 l/ha.** Purkšti kai augalai pasiekia 10-15 cm aukštį. Jei reikia, kartoti po 10-14 dienų.**Cukriniai runkeliai: 3-5 l/ha.** Purkšti kai runkeliai turi 6 lapelius. Pakartoti, kai lapai pradeda dengti tarpelius.**Kukurūzai: 5,5 l/ha.** Purkšti, kai kukurūzai turi 4 lapelius. Kartoti pagal poreikį.**Bulvės: 3-5 l/ha.** Purkšti, kai lapai pradeda dengti tarpelius. Kartoti pagal poreikį.**Kopūstai ir kitos daržovės: 3 l/ha.** Purkšti kai jau yra pakankamai lapijos.

Kartoti pagal poreikį.

Norint pasiekti geriausių rezultatų rekomenduojama purkšti vakare arba anksti ryte, kol augalai yra sukaupę pakankamai drėgmės.

Pastaba: Esant dideliame saulės aktyvumui ir temperatūrai aukštesnei nei +25° C, produkto nenaudoti.**MAIŠYMAS IR NAUDOJIMAS****Prieš atidarant ir naudojant pakuočius turinį stripai suplakti !**

Purkštuvų įranga privalo būti švari. Pripildyti purkštuvu rezervuarą ½ reikiama vandens kiekio ir įjungti maišyklę. Maišant į rezervuarą įpilni reikiama LEADER Mg S kiekį.

Neleisti mišiniui stovėti be maišymo. Supiluti likusį reikiama kiekį vandens ir nedelsiant naudoti.

Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.

Norint pagerinti purškiamo tirpalo prilipimą, pasklidimą ir sumažinti lietaus nuplovimo riziką, rekomenduojama pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos (PAM).

Pastaba: ruošiant mišinius- LEADER Mg S į purkštuvą pilamas paskutinis, kai jau pilnai ištirpo kiti ruošiamo tirpalo komponentai.

LEADER

Mg + S

**LEADER Mg S**

Škistošs, koncentrēts magnija un sēra elementu mēšlošanas līdzeklis, paredzēts augu mēšlošanai caur lapām

BARĪBAS ELEMENTU SATURS, %

Sērs (SO ₃):	638 g/l	34,0% w/w	(23,6% w/w)
Magnijs (MgO):	340 g/l	63,6% w/w	(44,2% w/w)
Koncentrēta suspensija (SC).			
Fizikālais svars: 1,43 – 1,45 kg/L			

LEADER Mg S ir izcili sabalansēts magnija un sēra saturošs mēšlojuma līdzeklis, kas piemērots graudaugu, kukurūzas, rapsa, cukurbietšu, lauku pupu, zirņu un citu dārzeņu kultūru papildmēšlošanai caur lapām.**LIETOŠANAS DEVAS UN LAIKS****Labība: 1,5-4 l/ha.** Smidzināt no triju lapu posma un atkārtot pēc vajadzības.**Rapsis: 1,5-4 l/ha.** Smidzināt rudenī, kad rapšiem ir 6-8 lapas. Pavasarī, ja nepieciešams, atkārtot.**Pupas, zirņi: 4-7 l/ha.** Smidzināt, kad augi sasniedz 10-15 cm augstumu. Ja nepieciešams, pēc 10-14 dienām atkārtot.**Cukurbietes: 3-5 l/ha.** Smidzināt, kad cukurbietēm ir 6 lapas. Atkārtot, kad lapas sāk nosegt starprindas.**Kukurūzi: 5,5 l/ha.** Smidzināt, kad kukurūzi ir 4 lapas. Atkārtot pēc nepieciešamības.**Kartupeļi: 3-5 l/ha.** Smidzināt, kad lapas sāk nosegt starprindas. Atkārtot pēc nepieciešamības.**Kāposti un citi dārzeņi 3 l/ha.** Smidzināt, kad lapojums ir pietiekami liels. Atkārtot pēc nepieciešamības.**Ūdens daudzums – vismaz 200 l/ha.** Ūdens daudzums jāpalielina, ņemot vērā sējuma blīvumu un lapojuma lielumu.**Piezīme:** Ražotājs Headland rekomendē pēc iespējas biežāk veikt augšnes un audu analīzes, lai nodrošinātu, ka sējums saņem optimālu barības vielu daudzumu. Produktu nelietot tiešos saules staros vai apstākļos, kad gaisa temperatūra pārsniedz +25°C. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, smidzināšanu ieteicams veikt vakarā vai agrī no rīta, kad augi ir uzkrājuši pietiekami daudz mitruma.**SMIDZINĀJUMA SAGATAVOŠANA****Pirms atvēršanas un lietošanas iepakojumu spēcīgi sakratīt!**

Smidzinātāja iekārtai jābūt tīrai. Piepildīt smidzinātāja rezervuāru ar ½ nepieciešamā ūdens daudzumu un ieslēgt maišītāju. Maisot ieliet rezervuārā nepieciešamo LEADER Mg S daudzumu.

Nelietot maišījumu stāvēt bez maišīšanas. Pieliet atlikušo nepieciešamo ūdens daudzumu un nekavējoties izlietot maišījumu.

Pēc lietošanas rūpīgi izmazgāt smidzinātāju.

Lai uzlabotu izsmidzinātā šķidruma piekšanos augu virsmai, iekļūšanu augos un samazinātu lietus noskaļošanas risku, ieteicams pievienot virsmaktīvas vielas.

**LEADER Mg S**

Lahustuv, kontsentrēritud vāetis Magnesiumi ja vāāvilga, ette nāhtud taimede vāetamiseks lehtede kaudu

KOOSTIS

Magnesium (MgO):	340 g/l	34,0% w/w	(23,6% w/w)
Vāāvel (SO ₃):	638 g/l	63,6% w/w	(44,2% w/w)
Kontsentrēritud suspensioñ (SC).			
Erikaal: 1,43 – 1,45 kg/L			

LEADER Mg S - on hoolikalt tasakaalustatud magnesiumi ja vāāvili vāetis, mis rahulab teraviljade, maisi, rapsi, suhkrupeedi, oa, herne ja muude taimede toitañvajadusi lehtede kaudu vāetamisel.**NORMID JA KASUTAMISAEG****Teraviljad: 1,5-4 l/ha.** Pritsida aiates 3 lehe faasist ja korrata vastavalt vajadusele.**Raps: 1,5-4 l/ha.** Pritsida sūgisel, kui rapsil on 6-8 lehte. Vajaduse korral korrata pritsimist kevadele.**Uba, hernes: 4-7 l/ha.** Pritsida, kui taimed on 10-15 cm kōrgused. Vajadusel korrata pritsimist 10-14 pāeva mōodumisel.**Suhkrupet: 3-5,5 l/ha.** Pritsida, kui taimedel on 6 lehte. Korrata pritsimist, kui lehed hakkavad katma reavahesid.**Mais: 5,5 l/ha.** Pritsida, kui taimedel on 4 lehte. Korrata vajaduse korral.**Kartul: 3-5,5 l/ha.** Korrata pritsimist, kui lehed hakkavad katma reavahesid. Korrata vajaduse korral.**Kapsas ja teised kōogiviljad: 3 l/ha.** Pritsida, kui lehestik on piisav. Korrata vajaduse korral.**Veekogus - vāehemalt 200 l/ha.**

Veekogust suurendatakse lāhtudes kŭlvihtedusest ja lehestiku suurusest.

Mārkus: Tootja Headland soovita, et mulla ja taimekoee analiuse teostataks vōimalkult sagedamini kŭlvide optimaalse varustamise tagamiseks toitañetega.

Mitte kasutada toodet otsesee pāikeevalguse korral vōi kōrgemal kui +25°C temperatuuril. Parima tulemuse saavutamiseks soovitatakse pritsida õhtul vōi varahommikul, kui taimed on varunud piisavalt niiskust.

SEGAMINE JA KASUTAMINE**Enne avamist ja kasutamist loksutada pakendit tugevasti!**

Pritsimiseade peab olema puhas. Valada pritsimiseadme mahutisse ½ vajalikust veekogusest ja lŭlitada segaja sisse. Segades valada mahutisse vajalik kogus LEADER Mg S.

Mitte lasta segul seista ilma segamata. Lisada ŭleljāanud kogus vetti ja tarvitada koheselt.

Pārast kasutamist pesta pritsimiseadete hoolikalt.

Pihustuslahuse haardumise, levimise ja pritsimise parandamiseks on soovitatav lisada pindaktiivseid aineid.

SUDERINAMUMAS

LEADER Mg S yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu augalų apsaugos priemonių.

Dėl kitų maišymo galimybių kreipkitės į šio produkto platiotoją.

Laikyti naudojimą atidžiai perskaitykite taip pat ir produkto, su kuriuo bus maišoma, instrukcija.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti virš + 5°C.

LEADER Mg S laikykite vėsioje, gerai ventiliuojamoje, sandėliavimui skirtoje patalpoje, atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvūnų pašaro.

SAUGOS PRIEMONĖS

Gali sukelti odos dirginimą.

PAVOJINGA

Krupočiai nuplaukite rankas po produkto naudojimo.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS ANT ODOS: Odą plaukite dideliu vandens ir muilo kiekiu.

ATSIRADUS ODOS DIRGINIMUI/BERIMUI : nedelsiant skambinti APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją.

Nedelsiant nusivilkite/pašalinkite visus užterštus drabužius, būtinai išskalbi prieš vėl juos apsivilkiant.


Sudėtyje yra 1,2 benzisotiazolino-3, gali sukelti alerginę reakciją.

Apsinuodijimo atveju skambinkite į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pagaminta Jungtinėje Karalystėje (EU)
Serijos nr.: žiūrėti ant pakuotės

Importuotojas:

UAB „Agrochema“
Jonaiškio k., Ruklos sen.
LT-55296 Jonavos r.
Tel. (8 349) 56 142,
www.agrochema.lt

LT**LV****EE****SADERĪBA**

LEADER Mg S ir fiziškai ir ķīmiski saderīgs ar lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļu. Par citām maišījuma lietošanas iespējām vērsties pie šī produkta izplatītāja.

Vairāk informācijas atradīsiet:

www.headlandcroppnutrition.com.

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasīt arī tā produkta instrukciju, ar kuru maišījums tiks sajaukts.

Piezīme: gatavojot maišījumus, **LEADER Mg S** mēslošanas līdzeklis smidzinātājā ir jālej pēdējais, kad citi gatavojamā šķidruma komponenti ir pilnībā izšķīduši.

GLABĀŠANA

Sargāt no sasaišanas. Glabāt +5°C temperatūrā.

LEADER Mg S glabāt vēsā, labi vēdināmā, glabāšanai paredzētā telpā.

Sargāt no tiešiem saules stariem un tiešiem siltuma avotiem.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem, dzērieniem vai lopbarības.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

H315: Kairina ādu.

BĪSTAMI

P264: Pēc produkta lietošanas kārtīgi nomazgāt rokas.

P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ācu (sejas) aizsargus.

P302+352: SASKARĒ AR ĀDU: Maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P332+313: JA RODAS ĀDAS IEKAISUMS/IZSITUMI: nekavējoties zvanīt uz TOKSIKOĻĢIJAS KONTROLES UN INFORMĀCIJAS CENTRU vai meklēt medicīnisku palīdzību.

P362: Nekavējoties novilkt/līkvidēt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

Satur 1, 2 benzisotiazolino-3. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Ražotājs: Headland, Apvienotā Karaliste (EU)

Sērijas Nr.: skatīt uz iepakojuma.

Izplatītājs:

SIA "Agrochema Latvia",
"Agrocenters", Dzintimīsa, Iecavas novads, LV-3913,
Tel. +371 63 941 223,
www.agrochema.lv

SOBIVUS

LEADER Mg S võib kasutada koos paljude taimekaitsevahenditega. Teiste segamisvõimaluste osas pöörduge selle toote levitaja poole.

Rohkem informatsiooni võite leida:

www.headlandcroppnutrition.com.

Enne kasutamist lugege tähelepanelikult läbi ka kasutusjuhend toote kohta, millega kavatsete segada.

Märkus: Segude valmistamisel valada **LEADER Mg S** pritsimiseadmesse viimasena, kui teised lahuse komponendid on juba täielikult sulanud.

LADUSTAMISTINGIMUSED

Kaitsta külmumise eest. Hoida üle + 5°C temperatuuril.

LEADER Mg S hoidke jahedas, hästi ventileeritavas, ladustamiseks ettenähtud ruumis.

Vältige otsest päikesevalgust ja otsest soojusallikaid.

Hoida lastele ligipääsmatus kohas, eemal toiduainetest, jookidest või loomasöödad.

OHULAUSED

H315: Põhjustab nahaärritust.

HOIATUSLAUSED

P264: Pärast kasutamist pesta hoolikalt käsi.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriieidust/kasutada silmade (näo) kaitsevahendeid.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.

P332+313: NAHAÄRRITUSE VÕI LÕÖBE KORRAL: pöördua MÜRGIUSTEABEKESKUSE või arsti poole.

P362: Võtta saastunud riivad seljast ja pesta need enne järgmist kasutamist. Sisaldab 1,2-benzisotiazolino-3-ooni, mis võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Toodetud Ühendkuningriigis (EU)

Seerianumber: vaata pakendilt.

Importija

Agrochema Eesti OU,
Turu 7A, Jõgeva, EE-48303
Tel.: +372 7769 410
www.agrochemaeesti.ee



Pakuotė/lepakojuoms/Pakend: 10 L

15136455
20032018

Headland Agrochemicals Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.
Tel: + 44 (0) 1244 537370 E-mail: flintshire.enquiry@fmc.com
www.headlandcroppnutrition.com

