

**LEADER RAPESEED**

Koncentruota mikroelementinė trąša, skirta rapsų, ankštinių ir kitų lauko bei daržo augalų tręšimui per lapus

**SUDĖTIS**

Azotas (N):	32 g/l	3,2% w/v	(2,1% w/w)
Kalcio oksidas (CaO):	126 g/l	12,6% w/v	(8,3% w/w)
Magnis (MgO):	53 g/l	5,3% w/v	(3,5% w/w)
Siera (S):	148 g/l	14,8% w/v	(9,8% w/w)
Boras (B):	60 g/l	6,0% w/v	(4,0% w/w)
Manganas (Mn):	22 g/l	2,2% w/v	(1,5% w/w)
Molibdenas (Mo):	2 g/l	0,2% w/v	(0,1% w/w)
Cinkas (Zn):	2 g/l	0,2% w/v	(0,1% w/w)

Koncentruota suspensija (SC).  
Fizikinis svoris: 1,49 – 1,53 kg/L.

**NORMOS IR NAUDOJIMO LAIKOTARPIS**

2,5 l/ha su mažiausiai 200 litrų vandens.

**Rapsai:** pradėti purkšti kai rapsai turi 4 lapelius, kartoti kas 10-14 dienų pagal poreikį. Ypač naudinga panaudoti kai rapsai pradeda auginti stiebą.

Kapina tolygų augalų žydėjimą ir brandimą, gerina derliaus kokybę.

**Pupos, žirniai, sojos, kiti lauko ir daržo augalai:** vegetacijos pradžioje, kai augalai turi pakankamai lapijos trąšų mišinii užpurkšti. Kartoti kas 10-14 dienų poreikį, bet ne vėliau, nei likus 4 savaitėms iki derliaus nuėmimo.

**Pastaba:** Esant dideliam saulės aktyvumui ir temperatūrai aukštesnei nei +25°C, produkto nenaudoti.

**MAIŠYMAS IR NAUDOJIMAS**

**Prieš atidarant ir naudojant pakuotės turinį stipriai suplakiti!**

Purkštuvų įranga privalo būti švari. Pripildyti purkštuvo rezervuarą ½ reikiamo vandens kiekio ir įjungti maišytuvą. Maišant į rezervuarą įpilti reikalingą LEADER Rapeseed kiekį. Neleisti mišinii stovėti be maišymo. Supilti likusį kiekį vandens ir nedelsiant sunaudoti. Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.

Norint pagerinti purškiamo tirpalo prilipimą, pasklidimą ir sumažinti lietaus nuplovimo riziką, rekomenduojama pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos (PAM).

**LEADER RAPESEED**

Šķīstošs, koncentrēts mēšlošanas līdzeklis, paredzēts rapsu, pākšaugu un citu lauka un dārza kultūru papildmēšlošana caur lapām

**BARĪBAS ELEMENTU SATURS, %**

Slāpekļis (N):	32 g/l	3,2% w/v	(2,1% w/w)
Kalcijs oksīds (CaO):	126 g/l	12,6% w/v	(8,3% w/w)
Magnijs (MgO):	53 g/l	5,3% w/v	(3,5% w/w)
Sērs (S):	148 g/l	14,8% w/v	(9,8% w/w)
Bors (B):	60 g/l	6,0% w/v	(4,0% w/w)
Mangāns (Mn):	22 g/l	2,2% w/v	(1,5% w/w)
Molibdēns (Mo):	2 g/l	0,2% w/v	(0,1% w/w)
Cinks (Zn):	2 g/l	0,2% w/v	(0,1% w/w)

Koncentrēta suspensija (SC).  
Fizikālais svars: 1,49 – 1,53 kg/L.

**LEADER Rapeseed** – šķīstošs mēšlošanas līdzeklis, paredzēts, lai nodrošinātu augus ar optimālu nepieciešamo barības vielu daudzumu. Veicina vienmērīgu augu ziedēšanu un nobriešanu, uzlabo ražas kvalitāti.

**LIETOŠANAS DEVA**

2,5 l/ha ar vismaz 200 litriem ūdens. Nodrošinot vienmērīgu lapojuma apsmidzināšanu.

**LIETOŠANAS LAIKS**

**Rapsis:** sākt smidzināt, kad rapsiem ir četrus lapināš; pēc nepieciešamības smidzināt ik pēc 10–14 dienām. Īpaši svāri ir veikt smidzinājumu, kad rapsiem vīrs lapojuma sāk pacelties ziedpumpurī un notiek stublāja pagarināšana - augi strauji veido lielu zaļo masu.

**Pupas, žirņi, soja un citi lauka un dārza kultūras:** Veģetācijas sākumā, kad augiem jau ir pietiekami liels lapojums, lai varētu veikt papildmēšlojuma smidzinājumu caur lapu virsmu. Ja nepieciešams, smidzināšanu atkārtot ik pēc 10–14 dienām, bet ne vēlāk kā četras nedēļas pirms ražas novākšanas.

**Piezīme:** Ražotājs Headland rekomendē pēc iespējas biežāk veikt augšnes un augu analīzes, lai nodrošinātu, ka sējums saņem optimālu barības vielu daudzumu. Produktu nelietot tiešos saules staros vai apstākļos, kad gaisa temperatūra pārsniedz +25°C. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, smidzināšanu ieteicams veikt vakarā vai agri no rīta, kad augs ir uzkrājis pietiekami daudz mitruma.

**SMIDZINĀJUMA SAGATAVOŠANA**

**Pirms atvēršanas un lietošanas iepakojumu spēcīgi sakratīt!**

Smidzinātāja iekārtai jābūt tīrai. Piepildīt smidzinātāja rezervuāru ar ½ nepieciešamā ūdens daudzumu un ieslēgt maišītāju. Maisot iepildīt rezervuārā nepieciešamo LEADER Rapeseed daudzumu.

Nelaut maišījumam stāvēt bez maišīšanas. Pieliet atlikušo ūdens daudzumu un nekavējoties izlietot maišījumū.

Pēc lietošanas rūpīgi izmazgāt smidzinātāju.

Lai uzlabotu izsmidzinātā šķīduma piekrišanas augu virsmai , iekliūšanu augos un samazinātu lietus noskalošanas risku, ieteicams pievienot virsmaktīvas vielas.

**LEADER RAPESEED**

Lahustuv, konsentreerituv vēetis, ette nāhtud rapsi, kaunviljāde ja teiste põllu- ja alataimed vēetamiseks lehtede kaudu

**KOOSTIS**

Lāmmastik (N):	32 g/l	3,2% w/v	(2,1% w/w)
Kaltsiumoksiid (CaO):	126 g/l	12,6% w/v	(8,3% w/w)
Magneesium (MgO):	53 g/l	5,3% w/v	(3,5% w/w)
Vāāvel (S):	148 g/l	14,8% w/v	(9,8% w/w)
Boor (B):	60 g/l	6,0% w/v	(4,0% w/w)
Mangaan (Mn):	22 g/l	2,2% w/v	(1,5% w/w)
Molibdeen ( Mo):	2 g/l	0,2% w/v	(0,1% w/w)
Tsink (Zn):	2 g/l	0,2% w/v	(0,1% w/w)

Konsentreerituv suspensioon (SC).

Erikaal: 1,49 – 1,53 kg/L.

**LEADER Rapeseed** – lahustuv vēetis, ette nāhtud optimaalseks varustamiseks esmavajālike toitainetega. Stimuleerib taimede ūhtlast ŗtsemist ja valmimist, parandab saagi kvaliteeti.

**NORM**

2,5 l/ha koos vāhemalt 200 litrii veega. Tagage lehestiku ūhtlane pritsimine.

**KASUTAMISE AEG**

**Raps:** alustada pritsimist, kui rapsil on 4 lehte, korrata vajaduse korral 10-14 pāevaste vāhedega.

Eriti kasulik kasutada, kui rapsil hakkab kasvama vars.

**Uba, hernes, soja, teised põllu- ja alataimed:** Vegetatsiooni alguses, kui taimedel on juba piisavalt lehestikku vāetisesegu jaoks. Vajaduse korral korrata pritsmist iga 10-14 pāeva jārel, kuit mitte hiljem kui saagi koristamiseni on jānāud 4 nādalat.

**Mārkus:** Toolja Headland soovitab, et mulla ja taimekoee analūise teostataks vōimalikult sagedamini kŭlvide optimaalse varustamise tagamiseks toitainetega. Mitte kasutada toodet otsesee pāikeesevalguse kāes vōi kōrgemal kui +25°C temperatuuril. Parima tulemuse saavutamiseks soovitatakse pritsida ŗhtul vōi varahommikul, kui taimed on varunud piisavalt niiskust.

**SEGAMINE JA KASUTAMINE**

**Enne avamist ja kasutamist loksutada pakendit tugevasti!**

Pritsimiseade peab olema puhas. Valada pritsimiseademe mahutisse ½ vajalikust veekogusest ja lŭlitada segaja sisse. Segades valada mahutisse vajalik kogus LEADER Rapeseed.

Mitte lasta segul seista ilma segamata. Lisada ūlejānāud kogus vett ja tarvitada koheselt.

Pārast kasutamist pesta pritsimiseadeti hoolikalt.

Pihustuslahuse hāardumise, levimise ja pritsimise parandamiseks on soovitatav lisada pindaktiivseid aineid.

**SUDERINAMUMAS**

**LEADER Rapeseed** yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu pesticidų, augimą reguliuojančių medžiagų ir mikroelementų. Dėl kitų mašymo galimybių kreipkitės į produkto platintoją. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite gamintojo instrukciją skirtą kitam mišinio komponentui.

**SANDĖLIAVIMO ŠALYGOS**

Laikyti virš + 5°C.

**LEADER Rapeseed** laikykite vėsioje, gerai ventiliuojamoje, sandėliavimui skirtoje patalpoje, atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvūnų pašaro.

**SAUGOS PRIEMONĖS**

**LEADER Rapeseed** nėra klasifikuojama kaip pavojinga medžiaga, remiantis CLP (REG EC 1272/2008). Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazolinonu-3, kuris gali sukelti alerginę reakciją.

Apsinuodijimo atveju skambinkite į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pašaminta Jungtinėje Karalystėje (EU)  
Serijos nr.: žiūrėti ant pakuotės

**Importuotojas:**

UAB „Agrochema“  
Jonalaukio k., Ruklos sen.  
LT-55296 Jonavos r.  
Tel. (8 349) 56 142,  
www.agrochema.lt

**SADERĪBA**

**LEADER Rapeseed** ir fiziškai un ķīmiski saderīgs ar lielāko daļu pesticīdu, augšanu regulējošām vielām un mikroelementiem. Par citām maisījuma iespējām vērsties pie produkta izplatītāja. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasīt citam maisījuma komponentam paredzēto ražotāja instrukciju.

**GLABĀŠANA**

Sargāt no sasaldāšanas. Glabāt +5°C temperatūrā.

**LEADER Rapeseed** glabāt vēsā, labi vēdināmā, glabāšanai paredzētā telpā.

Neglabāt tiešos saules starus vai tiešu siltuma avotu tuvumā. Glabāt bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem, dzērieniem un lopbarības.

**DROŠĪBAS PASĀKUMI**

**LEADER Rapeseed** saskaņā ar CLP (REG EK 1272/2008) netiek klasificēta kā bīstama viela. Satur 1, 2 benzisotiazolinonu-3, kurš var izraisīt alergisku reakciju.

**Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

Ražotājs: Apvienotā Karaliste (EU)

Sērijas Nr.: skatīt uz iepakojuma.

**Izplatītājs:**

SIA "Agrochema Latvia",  
"Agrocentrs", Dzintarmīsa, Iecavas novads, LV-3913,  
Tel. +371 63 941 223,  
www.agrochema.lv

**SOBIVUS**

**LEADER Rapeseed** võib kasutada koos paljude pestitsiidide, kasvustimulaatorite ja mikroelementidega. Teiste segamisvõimaluste osas pöörduge selle toote levitaja poole. Enne kasutamist lugege tähelepanelikult läbi segu teise komponendi tootja kasutusjuhend.

**LADUSTAMISTINGIMUSED**

Kaitsta külmumise eest. Hoida üle + 5°C temperatuuril.

**LEADER Rapeseed** hoidke jahedas, hästi ventileeritavas, ladustamiseks ettenähtud ruumis. Mitte hoida otseste päikesevalguse käes ja otseste soojusallikate kõrval. Hoida lastele ligipääsmatus kohas, eemal toiduainetest, jookidest või loomasöödadest.

**OHULAUSED**

**LEADER Rapeseed** ei klassifitseerita ohtliku aineina lähtudes CLP (REG EC 1272/2008). Sisaldab 1,2-benzisotiazolin-3-ooni, mis võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Toodetud Ühendkuningriigis (EU)

Seerianumber: vaata pakendit.

**Importija:**

Agrochema Eesti OU,  
Turu 7A, Jõgeva, EE-48303  
Tel.: +372 7769 410  
www.agrochemaeesti.ee



# Pakuotē/lepakojuoms/Pakend: 10 L

15136453  
20032018

Headland Agrochemicals Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.  
Tel: + 44 (0) 1244 537370 E-mail: flintshire.enquiry@fmc.com  
www.headlandcroppnutrition.com